

# Zadania kwalifikacyjne na WWW17

## „OTW”

Adam Gonstal

2 kwietnia 2021

*A Pan ma inną całkę? - Uzasadnienie Równań Einsteina*  
**Wersja 1.2.1**

## 1 Słowo Wstępu

Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania warto żebyś zapoznał się z wymaganiami i materiałami edukacyjnymi „przed warsztatami”. Deadline jest taki jak na stronie WWW17.

Zadania proszę przysyłać w formacie PDF (sugerowany latex) lub skanów, wrzuconych do PDF’a lub odpowiednio **ponumerowanymi** plikami na **stronę WWW** z Imieniem i Nazwiskiem w tytule. Polecam też wysłać maila, że wrzuciło zadania się na stronę, jeżeli ktoś będzie wysyłał zadania wcześniej.

W razie pytań/wątpliwości co do zadań/pytań natury ogólnej/ogólnej chęci rozmowy zachęcam do kontaktu na mail: ag9@onet.eu.

W tytule e-maila proszę o użycie formatu: [WWW17] Temat<sup>1</sup>.

Umożliwi mi to sprawniejsze odpowiedzi na maila. Jeżeli twoja wiadomość nie otrzymała odpowiedzi w przeciągu kilku dni, prosiłbym o ponowne wysłanie. (Co raczej nie powinno się zdarzyć.) Tym razem w tym roku zadania na moje warsztaty będą raczej średnio-trudne.

## 2 Zadania

Ćwiczenia mają być w domyśle krótkie a Zadania ciut dłuższe (a więc i trudniejsze). Punktów do zdobycia jest 20. Uwaga We wszystkich zadaniach obowiązuje konwencja sumacyjna Einsteina, chyba że napisano inaczej.

Powodzenia!

### 2.1 Pochodne & Całki

Ćwiczenie 1.1 (1pkt.) Oblicz funkcję:

$$f(x) = \frac{\partial}{\partial x} e^x \sinh(x) \cos(y)$$

$$g(x) = \frac{\partial}{\partial x} \cos(x) \sin(x)$$

Ćwiczenie 1.2 (1 pkt.) Oblicz

$$\int \sin(x) \cos(x) dx$$
$$\int_{-1}^1 \operatorname{sqr}(x) dx$$

---

<sup>1</sup>Np. Zadanie / Pytanie dot zadania nr itd.

Pytanie z gwiazdką (nie punktowane) Z jakiego twierdzenia, przy liczeniu tej całki cicho korzystamy w drugim przykładzie w 1.2? I nie chodzi tu Tw. Newtona.

## 2.2 Algebra Liniowa, czyli o wektorkach

Ćwiczenie 2.1 (1 pkt.)

Napisz definicje wektora, jaką **tobie** się wydaje/jaką znasz.

Ćwiczenie 2.2 (1pkt)

Zapoznaj się z konwencją sumacyjną Einsteina i napisz, jednym zdaniem na czym polega.

Tekst do następnych ćwiczeń/zadań.

Podstawową ideą leżącą u podstaw wektorów, oraz przestrzeni wektorowych jest fakt że istnieje jakiś **najmniejszy** (skończony lub nie) zbiór wektorów wyznaczający<sup>2</sup> wszystkie możliwe wektory które rozważamy (inaczej mówiąc daną przestrzeń wektorową). Ten zbiór nazywamy **bazą** i oznaczamy je  $e_i$ , tj.  $i$ -ty wektor bazy.

Przykład „szkolny” wektor  $s = (a, b)$  oznacza tyle że  $s = ae_1 + be_2$ ,  $e_i$  to wektory bazy „zwykłe w „szkolnych” warunkach” mówi się o wektorach bazy  $e_x, e_y$  czyli o wektorach unormowanych (czyli o długości jeden) w „kierunku” odpowiednio  $x$  i  $y$ .

Ćwiczenie 2.3 (1 pkt.)

Ile elementów ma baza przestrzeni Euklidesowa dwu wymiarowa? <sup>3</sup> Jak przykładowe wektory bazy będą wyglądały na rysunku? Podaj przykłady przestrzeni która bazy ma:

- a)jednoelementowa,
- b)czteroelementową

Ćwiczenie 2.4 (1 pkt.)

Mamy sobie wektor  $v = 2e_1 + e_2$  w bazie  $e_1, e_2$ . Zdefiniujmy sobie bazę  $e'_1 = e_1 + e_2, e'_2 = e_1 - e_2$ . Znaleźć wektor  $v$  w nowej bazie.

Tekst do z ćwiczenia 2.5. Sumując powyższe rozważania można napisać jednym zdaniem: Dla każdego wektora  $v$  istnieje  $e_i$  baza, taką że wektor ten można zapisać jako

$$v = v^i e_i$$

Rozważmy teraz sobie taki napis, który będzie „nowym rodzajem” wektora , nazywa się on kowektorem<sup>4</sup>

$$u = u_i e^i$$

, będzie miał takie specjalne własności, że dla dla  $i \neq j$

$$e_i e^j = 0,$$

a dla  $i = j$  <sup>5</sup>

$$e_i e^j = 1$$

Ćwiczenie 2.5 (1 pkt) a) Rozpisz napis a)  $uv$ ? b) Policzyć go dla  $v = e^1 + 2e^2, u = e_2 + e_3$

<sup>2</sup>za pomocą dodawania i mnożenia

<sup>3</sup>Normalnie wektor-ki na płaszczyźnie

<sup>4</sup>Inaczej: Kowektor  $u$  jest jednocześnie wektorem, ale w innej przestrzeni wektorowej niż  $v$  związanej poprzez te następne dwa równania, wyznaczająca przestrzeń kowektorową utworzoną z przestrzeni wektorowej.

<sup>5</sup>czyli  $e_i e^i = 1$ , ale z kontekstu wynika indeks  $i$  jest ustalony, więc chodzi o jeden konkretny indeks, czyli np.  $e^1 e_1 = 1$

Do następnego ćwiczeń zapoznaj się z opuszczaniem i podnoszeniem wskaźników, przyda się do ćwiczenia 2.6 i 2.7 a). Wprowadźmy napis

$$g_{ij} := e_i e_j,$$

który będziemy nazywać tensorem metrycznym,<sup>6</sup> jest to iloczyn skalarny dwóch wektorów bazowych.

Ćwiczenie 2.6 (1pkt) Niech  $g_{11} = A, g_{22} = B, g_{12} = g_{21} = 0$  Opuść kowektor  $p = Be^1 + e^2$  do wektora.

Ćwiczenie 2.7 (2 pkt.)

- Zapisz  $uv$  używając tensora metrycznego.
- Podaj przykład przestrzeni, w której  $g_{ij} = 1$  dla  $i = j$ , a reszta  $g_{ij} = 0$
- Podaj przykład przestrzeni w której to tensor metryczny zawiera chociaż jedną nie zerową lub nie jedynkową składową.

### 3 Fizyka

Zadanie 3.1 (3pkt) „Prawda czy nie prawda”? Zasada Równoważności

Bardzo często w literaturze popularnonaukowej np klik lub tutaj klik, można spotkać stwierdzenie że będąc w jakimś pomieszczeniu <sup>7</sup>(np. w windzie) i czując oddziaływanie w „dół” bez obserwacji świata zewnętrznego **nie istnieje** doświadczenie, które powiedziało by czy przyspieszasz czy jesteś pod wpływem pola grawitacyjnego.

Ile prawdy jest w tym stwierdzeniu, czy jest ono **zawsze** prawdziwe, czy ono jest **prawdą**, półprawdą? czy całkowitym **falszem**? Odpowiedź uzasadnij. Uwaga Pytanie to jest wbrew pozorom całkiem skomplikowane i odpowiedź NIE jest trywialna, lecz żeby było jasno nie wymagam pisaniu eseju na ten temat.

Zadanie 3.2 (4pkt) Zakrzywienie czasoprzestrzeni u Newtona. Zasada Równoważności v2.

Alicja znajduje u góry rakiety się na wysokości  $h$  ponad Bolkem, który jest na dole rakiety. Rakieta przyspiesza z przyspieszeniem  $g$  w próżni. W podobnej sytuacji znajdują się dwa obserwatorzy (Antek i Basia) na dole i górze wieży, którzy są jednorodnym polu grawitacyjnym  $g$ . (np. Na Ziemi). Alicja wysyła w równych odstępach czasu  $\Delta\tau_a$  sygnały świetlne; do mierzenia czasu używa zegara, który znajduje się obok niej. W jakich odstępach czasu  $\Delta\tau_B$  Bolek odbiera sygnały, jeśli mierzy czas identycznym zegarem znajdującym się na jego wysokości? Co powiedzą Antek i Basia jeżeli oni powtórzą ten eksperyment?

Ogranicz się do Mechaniki Newtonowskiej i założenia, że światło porusza się wszędzie z taką prędkością.

Zadanie 3.3 (3pkt.) Potencjał Efektywny Klasyczny

Energie całkowitą można zapisać w postaci, za pomocą układu biegunowego

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + V = \frac{1}{2}m\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + V_{eff}$$

Tutaj  $r$  oznacza promień. Znajdź  $V_{eff}$  Narysuj kształt od promienia tej funkcji, jakie wnioski z tego wykresu wynikają dla orbit w problemie dwóch ciał, odpowiedź: energia jest zachowana.

---

<sup>6</sup>a dokładniej jego współczynnikami

<sup>7</sup>tu domyśle dowolnym